

核准日期：2004 年 06 月 24 日

修改日期：2020 年 07 月 30 日

丁溴东莨菪碱注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】


通用名称：丁溴东莨菪碱注射液

英文名称：Scopolamine Butylbromide Injection

汉语拼音：Dingxiu Donglangdangjian Zhushuye

【成份】本品主要成份为丁溴东莨菪碱，化学名称为：6 β ，7 β -环氧-3 α -羟基-8-丁基-1 α H，5 α H-托烷（一）-托品酸酯。

化学结构式：



分子式：C₂₁H₃₀BrNO₄

分子量：440.38

【性状】本品为无色的澄明液体。

【适应症】1. 用于胃、十二指肠、结肠内窥镜检查的术前准备，内镜逆行胰胆管造影，和胃、十二指肠、结肠的气钡低张造影或腹部 CT 扫描的术前准备，可减少或抑制胃肠道蠕动；2. 用于各种病因引起的胃肠道痉挛、胆绞痛、肾绞痛或胃肠道蠕动亢进等。

【规格】1ml：20mg

【用法用量】肌肉注射、静脉注射或溶于 5% 葡萄糖注射液、氯化钠注射液静脉滴注。成人每次 10~20mg，或一次用 10mg，间隔 20~30 分钟后再用 10mg。

【不良反应】可出现口渴、视力调节障碍、嗜睡、心悸、面部潮红、恶心、呕吐、眩晕、头痛等反应。

【禁忌】1. 严重心脏病、器质性幽门狭窄或麻痹性肠梗阻患者禁用；2. 青光眼、前列腺肥大患者慎用。

【注意事项】1. 本品应用出现过敏反应时应停药；2. 对于血压偏低者应用本品时，应注意防止产生体位性低血压；3. 皮下或肌注时要注意避开神经与血管，如需反复注射应不在同一部位，宜左右交替注射；4. 禁与碱、碘及鞣酸配伍。

【孕妇及哺乳期妇女用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【儿童用药】婴幼儿、小儿慎用。

【老年用药】老年人用药前应除外心脏病和前列腺肥大等病史。

【药物相互作用】1. 与其他抗胆碱能药、吩噻嗪类等药物合用时会增加毒性；2. 可拮抗甲氧氯普胺、多潘立酮等的促胃肠动力作用；3. 某些抗心律失常药（如奎尼丁、丙吡胺等）与本品合用要谨慎，因前者具有阻滞迷走神经作用，故能增强本品的抗胆碱能效应，导致口干、视力模糊、排尿困难，老年人尤当注意；4. 本品与拟肾上腺素能药物合用（如：右旋苯丙胺 5mg），可增强止吐作用，减少本品的嗜睡作用，但口干更显著；5. 与三环类抗抑郁药（阿米替林等）合用时，两者均具有抗胆碱能效应，口干、便秘、视力模糊等副作用加剧，可使老年患者发生尿潴留，诱发急性青光眼及麻痹性肠梗阻等，故而禁止这两种药物合用；6. 本品分别与地高辛、呋喃妥因、维生素 B2 等合用时，会明显增加后者的吸收；

7. 应用本品或其他抗胆碱能药物期间，舌下含化硝酸甘油预防或治疗心绞痛时，因唾液减少使后者崩解减慢，从而影响其吸收，作用有可能推迟及（或）减弱。

【药物过量】 如过量可引起谵妄、激动不安甚至惊厥、呼吸衰竭乃至死亡，可用拟胆碱药和其他对症处理进行抢救。

【药理毒理】 本品为 M 胆碱受体阻滞药。其外周作用与阿托品相似，仅在作用程度上略有不同：本品对平滑肌解痉作用较阿托品为强，能选择性地缓解胃肠道、胆道及泌尿道平滑肌痉挛和抑制其蠕动，亦可用于解除血管平滑肌痉挛及改善微循环；其对心脏、眼平滑肌（散瞳及调节麻痹）和唾液腺等腺体分泌的抑制作用较阿托品弱。其中枢作用主要有：对呼吸中枢具有兴奋作用；抗眩晕及抗震颤麻痹作用较阿托品强；但对中枢神经系统具有显著的镇静作用，应用较大剂量后多可产生催眠作用。因此，应用本品很少出现类似阿托品引起的中枢神经兴奋、扩瞳、抑制唾液分泌等副反应。

【药代动力学】 本品静脉注射后 2~4 分钟，皮下或肌肉注射 8~10 分钟产生药效，时间约 2~6 小时。本品主要随粪便排出，静脉用药后有一部分自尿中排出。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【包装】 安瓿瓶，2 支/盒；5 支/盒

【有效期】 24 个月。

【执行标准】 《中国药典》2020 年版二部

【批准文号】 国药准字 H20044277

【生产企业】

企业名称：山东益健药业有限公司

生产地址：济宁高新区黄屯镇第七工业园 A 区

邮政编码：272104

联系电话：0537-5665669

传真号码：0537-5665668